

PREPARO DO PACIENTE PARA OS DIFERENTES PROCEDIMENTOS

Radiografia

- ✓ Jejum de 12 horas nos animais que serão submetidos ao exame radiográfico da coluna e Displasia Coxofemoral, que serão realizados somente sob anestesia;
- ✓ Para o estudo do abdômen recomenda-se jejum de 2 a 6 horas, quando possível, pois o conteúdo digestório pode vir a prejudicar a visualização das estruturas abdominais;
- ✓ Para o estudo do tórax em pacientes com dispnéia severa sugere-se a utilização de anestesia com ventilação controlada;
- ✓ Os exames contrastados só deverão ser indicados após a realização de radiografias simples.

Ultra-sonografia

- ✓ Jejum de 4 a 8 horas (alimento sólido) para diminuir a quantidade de gás no trato digestório;
- ✓ A ingestão de líquido deve ser estimulada (água a vontade, caldo de carne ou frango, água de coco), com exceção do leite (aumenta a quantidade de gases) dificultando a realização do exame;
- ✓ O paciente não deve urinar pelo menos 2 horas antes do exame.

Biopsias guiadas

- ✓ Jejum de 12 horas (hídrico e alimentar) nos animais que serão submetidos à coleta de material, a qual será realizada somente sob anestesia ou sedação;
- ✓ No caso de biópsia hepática e esplênica solicitamos a realização prévia do coagulograma.

Cistocentese

- ✓ não deixar o animal urinar por pelo menos 2 horas antes do procedimento.

Paracentese e Pleurocentese

- ✓ não há procedimento de preparo.

Biopsias aspirativa de Linfonodos Regionais

- ✓ no caso de animal de difícil contenção deverá ser realizado com anestesia e assim jejum de 12 horas (hídrico e alimentar).

Biopsias de Pele

- ✓ jejum de 12 horas (alimentar e hídrico) para realização de anestesia

Colheita Hematológica

- ✓ quando possível jejum de 8 a 12 horas
- ✓ para avaliação do colesterol, triglicerídios e dosagens hormonais jejum obrigatório de 8 a 12 horas.

Colheita de Líquido céfalo-raquidiano

- ✓ jejum de 12 horas (hídrico e alimentar) para realização de anestesia.

Colheita de sangue para Titulação Antirábica

- ✓ Animal deverá estar vacinado contra a raiva, em período superior a 1 mês e inferior a 11 meses da data de vacinação. Não é aceita vacinação em campanha de raiva;
- ✓ Jejum alimentar de 6 a 8 horas.